

Analysis für Informatik & Wirtschaftsinformatik
(WS 2021/22 - Pinsker)
Prüfung am 7.10.2022

Name:

Matrikelnummer:

Nickname:

Prüfungsbogen:

Ihre Antworten - bitte 1 (=WAHR), 0 (=FALSCH), oder 2 (=WEISS NICHT)
eintragen!

Aufgabe	Antwort A	Antwort B	Antwort C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

- Bitte wählen Sie einen beliebigen Nickname - die Ergebnisse werden als für alle einsehbare Liste unter den Nicknamen veröffentlicht.
- Es sind 15 Aufgaben zu lösen, und jede Aufgabe besteht aus drei Teilfragen (A,B,C), welche jeweils mit 1 (=WAHR), 0 (=FALSCH), oder 2 (=WEISS NICHT) zu beantworten sind.
- WICHTIG: 1 (=WAHR) bedeutet, daß die jeweilige Behauptung für ALLE X, f, K, \dots aus der gegebenen Annahme folgt. Das heißt, daß die Behauptung notwendig ist (und nicht nur möglich).
- Sie bekommen für eine Aufgabe 4 Punkte, wenn Sie ALLE drei Teilfragen der Aufgabe richtig beantworten.
- Wenn Sie mindestens eine Teilfrage einer Aufgabe falsch beantworten, so bekommen Sie 0 Punkte.
- In allen anderen Fällen (also Aufgabe entweder gar nicht oder korrekt, aber unvollständig gelöst) bekommen Sie 1 Punkt.

Frage 1: Gegeben sei $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ durch $(x, y, z) \mapsto \frac{x^2 y^2 z^2}{x^6 + y^6 + z^6}$ falls $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$, und $f(0, 0, 0) = 0$.

- (A) $\lim_{t \rightarrow 0+} f(t, t, t) = \lim_{t \rightarrow 0-} f(t, t, t)$.
- (B) f ist an der Stelle $(0, 0, 0)$ stetig.
- (C) $\lim_{t \rightarrow 0+} f(t, 0, 0) = 0$.

Antwort:101

Frage 2: Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar.

- (A) Ist $f'(0) > 0$, so existiert ein Intervall um die Stelle 0 auf welchem f streng monoton steigend ist.
- (B) Ist $f'(0) = 0$, so existiert ein Intervall um die Stelle 0 auf welchem f konstant ist.
- (C) Ist f auf einem Intervall um die Stelle 0 konstant, so gilt $f'(0) = 0$.

Antwort:101

Frage 3: Sei $x \in \mathbb{R}$.

- (A) Wenn die Dezimaldarstellung von x unendlich ist, so gilt $x \notin \mathbb{Q}$.
- (B) Wenn $x \in \mathbb{Q}$, so ist die Dezimaldarstellung von x periodisch oder endlich.
- (C) Wenn $x \notin \mathbb{Q}$, so ist die Dezimaldarstellung von x nicht periodisch.

Antwort:011

Frage 4: Gegeben sei die Folge $a_n = \frac{\sqrt{n} \cdot (\ln n)^2}{n}$, wobei $n \geq 1$.

- (A) a_n ist konvergent.
- (B) a_n ist monoton.
- (C) a_n ist beschränkt.

Antwort:101

Frage 5: Gegeben sei die Folge $a_n = (-1)^n \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^n$

- (A) Die zugehörige Reihe ist konvergent.
- (B) Die zugehörige Reihe ist absolut konvergent.
- (C) $a_n = o(e^{-n})$.

Antwort:111

Frage 6: Sei $M \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ beschränkt und unendlich.

- (A) M enthält ein maximales Element.
- (B) Es existiert eine kleinste obere Schranke von M .
- (C) Existiert eine kleinste obere Schranke von M , so ist diese irrational.

Antwort:010

Frage 7: Gegeben sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $x \mapsto e^{-x^2} \cos x$.

- (A) f hat unendlich viele Nullstellen.
- (B) f nimmt nur positive Werte an.
- (C) f ist beschränkt.

Antwort:101

Frage 8: Gegeben sei $f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $x \mapsto e^x \cdot \frac{\sin(x^2)}{x \sin x}$.

- (A) Der Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow 0$ ist gleich 1.
- (B) $f(x)$ konvergiert, für $x \rightarrow 0$ von rechts, gegen ∞ .
- (C) Links- und rechtsseitiger Grenzwert von $f(x)$ für $x \rightarrow 0$ existieren, aber stimmen nicht überein.

Antwort:100

Frage 9: Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar.

- (A) Wenn $f(-1) < 0$ und $f(1) > 0$, so existiert $\xi \in (-1, 1)$ mit $f(\xi) = 0$.
- (B) Wenn $f(-1) < 0$ und $f(1) > 0$, so existiert $\xi \in (-1, 1)$ mit $f'(\xi) = 0$.
- (C) Wenn $f(-1) = 0$ und $f(1) = 0$, so existiert $\xi \in (-1, 1)$ mit $f'(\xi) = 0$.

Antwort:101

Frage 10: Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $x \mapsto x \cdot e^x$.

- (A) Die Fläche unter f über dem Intervall $[1, 2]$ ist eine rationale Zahl.
- (B) $x \mapsto (x + 1) \cdot e^x$ ist eine Stammfunktion von f .
- (C) Die Fläche unter f über dem Intervall $[0, c]$ ist gleich $o(e^{2c})$ für $c \rightarrow \infty$.

Antwort:001

Frage 11: Gegeben sei die Differentialgleichung $y'' + y = 0$.

- (A) Die Funktion $y = e^{-x}$ ist eine Lösung der Differentialgleichung.
- (B) Ist f eine nichtkonstante Lösung der Differentialgleichung, so ist f beschränkt.
- (C) Ist f eine nichtkonstante Lösung der Differentialgleichung, so hat f unendlich viele Nullstellen.

Antwort:011

Frage 12: Gegeben sei $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ durch $(x, y) \mapsto x \cdot \sin y$.

- (A) f hat mindestens ein lokales Extremum.
- (B) f ist partiell differenzierbar.
- (C) f hat bei $(0, 0)$ einen Sattelpunkt.

Antwort:011

Frage 13: Gegeben sei $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ durch $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.

- (A) Das Integral $\int_1^\infty f(x) dx$ ist eigentlich konvergent.
- (B) Die Reihe $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n}$ konvergiert eigentlich.
- (C) $f = o(x^{-\frac{3}{2}})$ für $x \rightarrow \infty$.

Antwort:000

Frage 14: Gegeben sei die Folge $a_n = \sin(\frac{\pi}{2} \cdot n) \cdot e^n$, wobei $n \geq 1$.

- (A) a_n ist beschränkt.
- (B) a_n konvergiert.
- (C) a_n hat genau einen Häufungspunkt.

Antwort:001

Frage 15: Gegeben sei $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ durch $x \mapsto \frac{(\ln x)^2 \cdot e^{2x}}{x^7}$.

- (A) $f(x) = O(x)$ für $x \rightarrow \infty$.
- (B) $f(x) = o(e^{x^2})$ für $x \rightarrow \infty$.
- (C) $e^x = O(f(x))$ für $x \rightarrow \infty$.

Antwort:011